

الحساسية المفرطة: الإبينفرين أولًا

تفاعل سريع قد يهدد الحياة... والتدخل المبكر ينقذ الطفل

علامات محتملة

صعوبة تنفس أو صفير

تورم اللسان أو الحلق

طفح منتشر مع قيء أو دوخة

شحوب أو انهيار مفاجئ

استخدم القلم

انزع غطاء الأمان

ضعه على منتصف خارج الفخذ

اضغط حسب تعليمات الجهاز

سجّل وقت الجرعة

بعد الجرعة

اتصل بالإسعاف فورًا

اجعل الطفل مستلقيًا إن أمكن

أعط جرعة ثانية إذا نصت الخطة

اذكر وقت الجرعات للمسعفين

لا تفعل

لا تنتظر مضاد الحساسية

لا تحقن في اليد أو القدم

لا تجعل الطفل يقف أو يمشي

لا تؤخر الإسعاف بعد التحسن

استخدم الإبينفرين فور الاشتباه حسب خطة الطفل.
اتصل بالإسعاف بعد الاستخدام ولا تترك الطفل وحده.

أ. د. عادل الحربي | استشاري طب الأطفال وأمراض الصدر وطب النوم
ADELCARE · dradelalharbi.com

المراجع: American Academy of Pediatrics · WAO