

الالتهاب الرئوي عند الأطفال

السعال والحمى قد يصاحبهما تنفس سريع أو مجهد يحتاج إلى تقييم طبي

علامات محتملة

- حمى وسعال
- سرعة التنفس
- ألم الصدر أو البطن
- قلة النشاط أو الشهية

راجع الطبيب اليوم

- تنفس أسرع من المعتاد
- حمى مستمرة
- قيء أو نقص السوائل
- سعال يزداد أو حالة عامة سيئة

العناية والمتابعة

- التزم بالعلاج الموصوف كاملًا
- قدم السوائل بكميات مناسبة
- راقب التنفس واليقظة والبول
- احضر للمتابعة إذا لم يتحسن

اذهب للطوارئ عند

- زرقة أو صعوبة شديدة في التنفس
- انكماش الصدر أو أنين
- عدم القدرة على الشرب
- خمول شديد أو تشنج

لا تبدأ مضادًا حيويًا متبقيًا في المنزل.
الطبيب يحدد الحاجة إلى العلاج بعد الفحص وقياس الأكسجين.

أ. د. عادل الحربي | استشاري طب الأطفال وأمراض الصدر وطب النوم
ADELCARE · dradelalharbi.com

المراجع: World Health Organization · UNICEF